



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI IMOLA,
AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER LA COPERTURA DI N.
4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 2



1. Durante la somministrazione di nutrizione enterale mediante Sondino Naso Gastrico, l'eccessiva velocità o elevati volumi possono provocare

- a. distensione e dolori addominali
- b. Stipsi
- c. Polmonite da aspirazione

2. Il Sig. Bianchi, di 68 anni viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere che prende in carico il paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica, ed è opportuno posizionare le sponde del letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- b. Si deve analizzare il rischio di cadute perché ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'infermiere esegue la valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- c. Non è importante analizzare il rischio cadute

3. Tra le maschere per l'ossigeno terapia elencate, quale è da considerarsi un sistema a basso flusso

- a. maschera di Venturi
- b. Occhialini Nasali
- c. Maschera con reservoir

4. Le urine che si presentano di colore ambrato sono un segno di

- a. infezione delle vie urinarie con presenza di pus
- b. presenza di globuli rossi o contaminazione da flusso mestruale
- c. presenza elevata di bilirubina

5. Procedura: Misurazione della glicemia tramite prelievo capillare. Indicare la corretta sequenza delle azioni

- Eseguire il lavaggio sociale delle mani o frizionamento con antisettico (1)
 - Introdurre la striscia reattiva nello strumento di misurazione (2)
 - Posizionare in maniera comoda il paziente ed assicurarsi una buona illuminazione (3)
 - Pungere il polpastrello con movimenti perpendicolari (4)
- a. 3-1-2-4
 - b. 2-1-4-3
 - c. 1-3-4-2

M
M
2009



6. l'utilizzo delle scale per la misurazione del dolore è indicato per

- a. la misurazione oggettiva del dolore
- b. la classificazione del tipo di dolore
- c. effettuare una diagnosi di natura del dolore

7. il drenaggio evacuativo ha lo scopo di

- a. favorire la risalite dei fluidi biologici
- b. svuotare all'esterno le raccolte liquide
- c. evitare la formazione di raccolte di pus

8. Come deve essere praticata la fototerapia in un neonato itterico

- a. esponendo il bambino vestito alla luce di lampade fluorescenti a luce blu
- b. esponendo il bambino nudo, con gli occhi protetti da una benda opaca, alla luce di lampade a luce bianca
- c. esponendo il bambino nudo, con gli occhi protetti da una benda opaca, alla luce di lampade fluorescenti a luce blu e somministrandogli spesso dei liquidi

9. quali sono i segni ed i sintomi dell'infezione del sito chirurgico

- a. dolore irradiato al perimetro della sutura, versamento ematico e trombosi
- b. disidratazione, sudorazione algida e ipotensione
- c. calore, rossore dolore e tumefazione

10. quando si introduce un Sondino Naso Gastrico in un paziente collaborante

- a. si invita la persona a bere un bicchiere d'acqua ed a deglutire più volte
- b. non si deve far bere un bicchiere d'acqua all'assistito
- c. si deve suggerire alla persona di non respirare al passaggio del sondino nell'orofaringe

