



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Dipartimento di Sanità Pubblica

**UOC Igiene e Sanità Pubblica
SSU Prevenzione Malattie Infettive**

Il Responsabile

**ai Genitori
al Personale scolastico**

Nella scuola si è verificato di recente un caso di sospetto **Morbillo**

Il Morbillo è una malattia virale molto contagiosa che presenta come primi sintomi: congiuntivite, raffreddore, tosse e febbre elevata. Dopo 3-4 giorni compaiono macchie sul volto, sul tronco e infine sugli arti.

La febbre tende ad aumentare (anche fino a 40°C) ed i bambini appaiono abbattuti. Se non compaiono complicanze, dopo alcuni giorni la febbre si attenua, le macchie tendono ad impallidire e la pelle può desquamarsi.

La trasmissione avviene attraverso le goccioline di saliva emesse dai soggetti infetti nella fase iniziale della malattia.

L'incubazione è di 2 – 3 settimane.

Le complicanze più frequenti sono rappresentate da otite media, broncopolmonite, laringotracheite o più raramente da meningo-encefalite acuta.

Rara ma molto grave è una complicanza che può insorgere dopo anni dall'infezione primaria: la panencefalite subacuta sclerosante caratterizzata da deterioramento comportamentale ed intellettuale e convulsioni.

Grazie alla diffusione della vaccinazione contro il morbillo sia la malattia che le complicazioni sono praticamente scomparse.

La vaccinazione, se eseguita entro 72 ore dal contagio può prevenire la malattia.

La Pediatria di Comunità, dopo una verifica, proporrà la vaccinazione contro il morbillo ai bambini che risultano a tutt'oggi non essere stati vaccinati, o a chi ha ricevuto nel passato solo una dose di vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'Igiene e Sanità Pubblica, telefonando dalle ore 12 alle 13,30 al numero 0542 604923

Dr Roberto Rangoni